


Avertissements agricoles

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Ministère de l'Agriculture
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
47, Rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL.
tél : 42/87/76/71.

PUBLICATION PERIODIQUE CPP N° 536 A D
Abonnement annuel : **150 F.**
Régisseur des Recettes : D.D.A.
C.C.P. 9063 96 U PARIS . **D.B.A.F.**

EDITION GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 380 D 14 OCTOBRE 1987 - ENVOI N° 23

CEREALES	: JNO faible colonisation de parcelles par les pucerons.
MAIS	: Prévision des risques d'infestation pyrale pour 1988 .
COLZA	: Pluie salubre .

CEREALES

JAUNISSE NANISANTE

Situation : Grâce au temps pluvieux, les pucerons ont faiblement volé des maïs vers les céréales.

On trouve des infestations inférieures à 1% . Les premières analyses de pouvoir virulifère montrent que celui - ci est très variable d'une région à une autre : - très faible sur PONTOISE, assez élevé sur BRIE COMTE ROBERT.

Préconisation : Observez vos parcelles en fin d'après midi.

Liste des produits autorisés :

Matière active	Spécialités commerciales	Dose en l/ha
alphanéthrine	Fastac	0,2 l
biphenthrine	Talstar	0,075 l
bromophos	Nexion 25	1,5 l
cyalothrine	Karaté	0,15 l
cyfluthrine	Baythroid	0,3 l
cyperméthrine	Cymbush	0,2 l
	Kafil super	0,2 l
	Mastor	0,4 l
	Sherpa 10	0,2 l
deltaméthrine	Decis C E	0,3 l
esfenvalérate	Sumialpha	0,25 l
fenvalérate	Sumicidin 10	0,25 l
fluvalinate	Mavrik	0,2 l

7.1.33

MAIS

■ PYRALE

■ Situation : Nous avons établi une cartographie des infestations de pyrale en ILE DE FRANCE à travers 45 parcelles non traitées (50 cannes de maïs disséquées par parcelle). Nous pouvons donc prévoir les risques d'infestations pour 1988 :

- Le VAL D'OISE est peu touché, une petite zone au nord du département présente des risques moyens (entre 0,5 et 0,8 larve par pied).
La région de MAGNY EN VEXIN est beaucoup moins infestée qu'en 1986.
- Toutes les YVELINES sont très infestées : de 0,8 à 3,2 larves par pied, les risques sont plus élevés que l'an passé. On retrouve une poche de moindre risque comme en 1986 dans le secteur de MONTFORT L'AMAURY.
- Le Nord de l'ESSONNE reste une région à risque faible.
- La SEINE & MARNE est dans son ensemble un département où l'on trouve plus d'une larve par pied. Deux zones de moindre risque apparaissent : de NANGIS à la FERTE GAUCHER et au Sud de NEMOURS - LORREZ LE BOCAGE.
La région de PROVINS est beaucoup plus infestée que l'an dernier.

■ Préconisation :

- Dans toutes les zones, il faut broyer les cannes de maïs après récolte pour détruire le plus grand nombre de chenilles.
- Les zones à moins de 0,5 larve par pied peuvent faire l'impasse du traitement pyrale.

COLZA

■ ALTISES

■ Situation : Toujours peu ou pas de captures dans les cuvettes jaunes.

■ Préconisation : Les colzas arrivant au stade 5 - 6 feuilles, ce ravageur n'est plus à craindre.

■ PUCERONS

■ Situation : La pluie a permis une épidémie de mycoses chez les pucerons verts qui sont en train de disparaître et une bonne croissance de la végétation.

■ Préconisation : Surveillez les pucerons cendrés dès le retour du beau temps.

.../...

3.1

734

